

Lunsumio[®]
mosunetuzumab-axgb
injection for intravenous use 1 mg | 30 mg

Lunsumio[®] **VELO**[™]
mosunetuzumab-axgb
subcutaneous injection 5 mg | 45 mg

Preguntas para hacerle a su equipo de atención

Utilice esta guía para prepararse para su próxima cita

Si tiene un linfoma folicular (FL, por sus siglas en inglés) que ha reaparecido o que no respondió a 2 o más tratamientos anteriores, es posible que tenga preguntas sobre sus opciones. Utilice esta guía cuando hable con su proveedor de atención médica sobre los próximos pasos en su proceso, incluida la selección de un plan de tratamiento y la determinación de si LUNSUMIO[®] o LUNSUMIO VELO[™] puede ser adecuados para usted.



El Centro de Recursos para Pacientes
está aquí para guiarlo a usted y a su cuidador
hacia los recursos adecuados

Llame al **(877) GENENTECH (436-3683)**
De lunes a viernes, de 6 A. M. a 5 P. M., hora estándar del Pacífico
Más información en www.LUNSUMIO.com

¿Qué es LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO?

LUNSUMIO (mosunetuzumab-axgb) o LUNSUMIO VELO es un medicamento recetado que se utiliza para tratar a adultos con linfoma folicular cuyo cáncer ha reaparecido o no ha respondido a tratamientos anteriores, y que ya han recibido dos o más tratamientos.

Se desconoce si LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO es seguro y eficaz en niños.

La aprobación condicional para este uso se basa en la tasa de respuesta. Hay estudios en curso para establecer en qué medida funciona el fármaco.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO?

LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO puede causar síndrome de liberación de citoquinas (CRS, por sus siglas en inglés), un efecto secundario grave que es frecuente durante el tratamiento con LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO, y que también puede ser severo o potencialmente mortal.

Consulte la Información de seguridad importante, incluidos los **Efectos secundarios graves**, así como la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento](#) de LUNSUMIO y la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento](#) de LUNSUMIO VELO.

Entender mis opciones de tratamiento:

- ☐ ¿Cuáles deben ser los objetivos de mi plan de tratamiento y por qué?
- ☐ ¿Cuáles son mis opciones de tratamiento y sus riesgos y beneficios?
- ☐ ¿Es posible la remisión con LUNSUMIO® o LUNSUMIO VELO™?
- ☐ ¿Cuáles son las principales diferencias entre la inyección subcutánea de LUNSUMIO VELO y la infusión intravenosa (IV) de LUNSUMIO?
- ☐ ¿Es adecuada para mí una inyección subcutánea o una infusión intravenosa?
- ☐ ¿Una inyección subcutánea me ayudaría a pasar menos tiempo en la clínica?
- ☐ ¿Cuántas visitas de tratamiento debo prever? ¿Cuánto tiempo permaneceré en tratamiento?
- ☐ ¿Qué efectos secundarios podría experimentar durante el tratamiento?

Prepararme para mi tratamiento:

- ☐ ¿Cuánto durará mi visita de tratamiento? ¿Dónde se llevará a cabo?
- ☐ ¿Necesito tomar premedicación en casa antes del tratamiento?
- ☐ ¿Qué síntomas debo vigilar en casa?
- ☐ ¿Qué puedo hacer para mejorar mi experiencia general de tratamiento y reducir los efectos secundarios?
- ☐ ¿Cómo monitorearán mi respuesta al tratamiento?
- ☐ ¿Cómo puedo saber si el tratamiento está funcionando?

Consulte la Información de seguridad importante, incluidos los **Efectos secundarios graves**, así como la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento](#) de LUNSUMIO y la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento](#) de LUNSUMIO VELO.

Lunsumio[®]
mosunetuzumab-axgb
injection for intravenous use 1 mg | 30 mg

Lunsumio[®] **VELO**[™]
mosunetuzumab-axgb
subcutaneous injection 5 mg | 45 mg

Después del tratamiento con LUNSUMIO® o LUNSUMIO VELO™:

☐ ¿Qué tipo de seguimiento necesitaré después del tratamiento y cuándo?

☐ ¿Qué puedo esperar una vez finalizado el tratamiento?

Obtener el apoyo adecuado:

☐ ¿A quién de mi equipo de atención puedo llamar para que me ayude con los siguientes temas?

- Pagar el tratamiento o acceder a programas de apoyo financiero
- Mantenerse saludable (nutrición y movimiento)
- Acceso al apoyo de salud mental
- Conseguir transporte hacia y desde mi centro de tratamiento
- Encontrar un grupo de apoyo comunitario/local
- Otros (por ejemplo, sobre FL, sobre tratamiento, efectos secundarios)

Notas:

Información de seguridad importante (continuación)

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO? (continuación)

Reciba asistencia médica de inmediato si desarrolla cualquier signo o síntoma de CRS en cualquier momento, incluidos:

- | | |
|---|------------------------|
| • fiebre de 100.4 °F (38 °C) o más | • dolor de cabeza |
| • escalofríos | • confusión |
| • presión arterial baja | • ansiedad |
| • latidos cardíacos rápidos o irregulares | • mareo o aturdimiento |
| • cansancio o debilidad | • náuseas |
| • dificultad para respirar | • vómitos |

Consulte la Información de seguridad importante, incluidos los **Efectos secundarios graves**, así como la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento](#) de LUNSUMIO y la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento](#) de LUNSUMIO VELO.

Lunsumio[®]
mosunetuzumab-axgb
injection for intravenous use 1 mg | 30 mg

Lunsumio[®] **VELO**[™]
mosunetuzumab-axgb
subcutaneous injection 5 mg | 45 mg

Información de seguridad importante (continuación)

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO? (continuación)

Debido al riesgo de CRS, usted recibirá LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO en un “plan de dosis ascendente”.

- El plan de dosis ascendente consiste en que usted recibe dosis “ascendentes” más pequeñas antes de recibir dosis más altas de LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO durante el primer ciclo de tratamiento
- Si su dosis de LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO se retrasa por cualquier motivo, es posible que tenga que repetir el “plan de dosis ascendente”
- Podría recibir medicamentos para ayudarle a reducir el riesgo de CRS antes de su dosis

Durante el tratamiento con LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO, su proveedor de atención médica lo examinará para detectar la presencia de CRS y puede tratarlo en un hospital si desarrolla signos y síntomas de CRS. Su proveedor de atención médica puede interrumpir temporalmente o discontinuar por completo su tratamiento con LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO si tiene efectos secundarios severos.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO?

LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO puede causar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Problemas neurológicos.** LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO puede causar problemas neurológicos graves y potencialmente mortales. Su proveedor de atención médica lo examinará para detectar problemas neurológicos durante el tratamiento con LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO. Su proveedor de atención médica también puede remitirlo a un proveedor de atención médica especializado en problemas neurológicos. Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si desarrolla cualquier signo o síntoma de problemas neurológicos durante o después del tratamiento con LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO, incluidos:

- | | | |
|---|---|--|
| - dolor de cabeza | - olvidar cosas u olvidar quién es o dónde está | - convulsiones |
| - entumecimiento y hormigueo en brazos, piernas, manos o pies | - problemas para hablar, leer o escribir | - problemas musculares o debilidad muscular |
| - mareo | - somnolencia o problemas para dormir | - pérdida de equilibrio o problemas para caminar |
| - confusión y desorientación | - temblores | - cansancio |
| - dificultad para prestar atención o entender las cosas | - pérdida del conocimiento | |

- **Infecciones graves.** LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO puede causar infecciones graves que pueden conducir a la muerte. Su proveedor de atención médica lo examinará para detectar signos y síntomas de infección antes y durante el tratamiento. Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si presenta cualquier signo o síntoma de infección durante el tratamiento con LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO, incluyendo:

- | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---|
| - fiebre de 100.4 °F (38 °C) o más | - falta de aire | - sensación de debilidad o malestar general |
| - tos | - erupción cutánea dolorosa | |
| - dolor en el pecho | - dolor de garganta | |
| - cansancio | - dolor al orinar | |

- **Linfocitopenia hemofagocítica (HLH, por sus siglas en inglés).** LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO puede causar un exceso de actividad del sistema inmunitario: una afección llamada linfocitopenia hemofagocítica. La HLH es potencialmente mortal y ha provocado la muerte en personas que recibieron tratamiento con LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO. Su proveedor de atención médica realizará un control de dicha afección, especialmente si su CRS persiste más de lo esperado. Los signos y síntomas de la HLH incluyen:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| - fiebre | - hematomas de fácil aparición | - problemas de hígado |
| - agrandamiento del bazo | - recuento bajo de células sanguíneas | |

- **Recuento bajo de células sanguíneas.** Los recuentos bajos de células sanguíneas son frecuentes durante el tratamiento con LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO, y también pueden ser graves o severos. Su proveedor de atención médica comprobará su recuento de células sanguíneas durante el tratamiento con LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO. LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO puede causar los siguientes recuentos bajos de células sanguíneas:

- **recuento bajo de glóbulos blancos (linfopenia [únicamente con LUNSUMIO VELO] y neutropenia).** Un nivel bajo de glóbulos blancos puede aumentar el riesgo de infección
- **recuento bajo de glóbulos rojos (anemia).** Un nivel bajo de glóbulos rojos puede causar cansancio y falta de aire
- **recuento bajo de plaquetas (trombocitopenia).** Un recuento bajo de plaquetas puede provocar hematomas o problemas de sangrado

Lunsumio[®]
mosunetuzumab-axgb
injection for intravenous use 1 mg | 30 mg

Lunsumio[®] **VELO**[™]
mosunetuzumab-axgb
subcutaneous injection 5 mg | 45 mg

Consulte la Información de seguridad importante, incluidos los **Efectos secundarios graves**, así como la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento](#) de LUNSUMIO[®] y la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento](#) de LUNSUMIO VELO[™].

Información de seguridad importante (continuación)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO? (continuación)

LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO puede causar efectos secundarios graves, que incluyen: (continuación)

- **Problemas relacionados con el crecimiento en el tumor o empeoramiento del tumor (exacerbación tumoral).** LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO puede causar un empeoramiento grave o severo de los tumores. Informe a su proveedor de atención médica si presenta alguno de estos signos o síntomas de exacerbación tumoral durante el tratamiento con LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| - dolor en el pecho | - dificultad para respirar | - dolor o hinchazón en la zona del tumor |
| - tos | - sensibilidad o inflamación de los ganglios linfáticos | |

Su proveedor de atención médica puede interrumpir temporalmente o discontinuar permanentemente el tratamiento con LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO si usted desarrolla efectos secundarios severos.

Los efectos secundarios más frecuentes de LUNSUMIO incluyen: CRS, cansancio, erupción cutánea, fiebre, dolor muscular, tos, comezón y entumecimiento, hormigueo o dolor en manos o pies (daño en los nervios).

Los efectos secundarios más frecuentes de LUNSUMIO VELO incluyen: reacciones en el lugar de la inyección, cansancio, erupción cutánea, CRS, COVID-19, dolor muscular y en las articulaciones y diarrea.

Los resultados de análisis de sangre anormales severos más comunes con LUNSUMIO incluyen: disminución del fosfato, aumento de la glucosa y aumento de los niveles de ácido úrico.

Los resultados de análisis de sangre anormales severos más comunes con LUNSUMIO VELO incluyen: disminución en el recuento de glóbulos blancos y aumento de los niveles de ácido úrico.

Antes de recibir LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si:

- ha tenido alguna vez una reacción a la infusión después de recibir LUNSUMIO
- tiene una infección o ha tenido una infección en el pasado que ha durado mucho tiempo o sigue reapareciendo
- tiene o ha tenido el virus de Epstein-Barr
- está embarazada o planea quedar embarazada. LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO puede dañar al feto. Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si queda embarazada o cree que pueda estarlo durante el tratamiento con LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO

Mujeres que pueden quedar embarazadas:

- su proveedor de atención médica debe realizarle una prueba de embarazo antes de iniciar el tratamiento con LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO
- utilice un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y durante 3 meses después de la última dosis de LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO
- está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento y durante los 3 meses siguientes a la última dosis de LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los complementos herbarios.

¿Qué debo evitar mientras recibo LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO?

No conduzca, maneje maquinaria pesada ni realice otras actividades peligrosas si presenta mareo, confusión, temblores, somnolencia o cualquier otro síntoma que altere la consciencia, hasta que desaparezcan los signos y síntomas. Pueden ser signos y síntomas de CRS o problemas neurológicos.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO. Hable con su proveedor de atención médica para obtener más información sobre los beneficios y los riesgos de LUNSUMIO o LUNSUMIO VELO.

Puede informar de los efectos secundarios a la FDA al (800) FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch. También puede informar sobre efectos secundarios a Genentech al (888) 835-2555.

Consulte la Información de seguridad importante, incluidos los **Efectos secundarios graves**, así como la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento](#) de LUNSUMIO® y la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento](#) de LUNSUMIO VELO™.

Lunsumio
mosunetuzumab-axgb
injection for intravenous use 1 mg | 30 mg

Lunsumio VELO
mosunetuzumab-axgb
subcutaneous injection 5 mg | 45 mg

Genentech
A Member of the Roche Group